

	<p>Object: <i>Anemia hirsuta</i> (L.) Sw.</p> <p>Museum: Naturhistorisches Museum Mainz / Landessammlung für Naturkunde Rheinland-Pfalz Reichklarastraße 10 55116 Mainz 06131-122646 naturhistorisches.museum@stadt.mainz.de</p> <p>Collection: Botanische Sammlung</p> <p>Inventory number: o. Inv.</p>
--	--

## Description

Die Farn-Gattung *Anemia* umfasst weltweit etwa 110 bis 115 Arten, die vor allem in Mittel- und Südamerika (z.B. 20 Arten in Mexiko, 70 Arten in Brasilien) vorkommen. Eine Art kommt auch auf Madagaskar, eine weitere auf dem indischen Subkontinent vor. Der Verbreitungsschwerpunkt von *Anemia hirsuta* liegt in Mittelamerika von wo die Art bis nach Venezuela, Kolumbien und Ecuador ausstrahlt. Auch auf den Großen Antillen existieren Vorkommen. Früher wurde der Gattungsname - wie auf dem hiesigen Etikett - häufig *Aneimia* geschrieben. Der hier gezeigte Beleg aus dem Herbarium von Ludwig Geisenheyner wurde von Philipp Wirtgen im Januar 1898 im Botanischen Garten von Bonn gesammelt.

Trivialnamen (nach: "Encyclopedia of Life"):

([\*]: bevorzugte Trivialbezeichnung)

- in Englisch: "Hairy Flowering Fern" [\*]

## Basic data

Material/Technique:

Measurements:

Herbarbogen: 41 x 27 cm

## Events

Collected	When	January 1898
	Who	Philipp Wilhelm Wirtgen (1806-1870)
	Where	

[Relation to  
person or  
institution]

When

Who

Franz Adolf Ludwig Geisenheyner (1841-1926)

Where

[Relation to  
person or  
institution]

When

Who

Philipp Wilhelm Wirtgen (1806-1870)

Where

[Relation to  
person or  
institution]

When

Who

Botanischer Garten Bonn

Where

## Keywords

- Anemia
- Herbarium
- Polypodiopsida
- Schizaeales
- Vascular plant

## Literature

- Frankenhäuser, Herbert (1995): Herbar Geisenheyner. - Mitteilungen der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft 16: 40-41. Mainz
- Hecker, Ulrich (2009): Die Botanischen Sammlungen des Naturhistorischen Museums Mainz. - Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv 47: 449-453. Mainz