

	<p>Object: Junger Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>) im Nest eines Teichrohrsängers (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)</p> <p>Museum: Naturhistorisches Museum Mainz / Landessammlung für Naturkunde Rheinland-Pfalz Reichklarastraße 10 55116 Mainz 06131-122646 naturhistorisches.museum@stadt.mainz.de</p> <p>Collection: Zoologische Sammlung</p> <p>Inventory number: W2007/5</p>
--	---

Description

Der Kuckuck ist ein typischer Brutparasit, der seine Eier in die Nester kleinerer Singvögel legt. Der weibliche Kuckuck legt pro Brutsaison bis zu 25 Eiern, im Durchschnitt jedoch nur neun. Pro Nest wird in der Regel ein Ei abgelegt. Aus dem Gelege des Wirtsvogels wird dafür ein Ei entfernt. Das Kuckucksei ist meist etwas größer als die Eier des Wirtsvogels, farblich aber optimal an diese angepasst. Jedes Kuckucksweibchen bevorzugt eine Wirtsvogelart. Rohrsänger gehören zu den bevorzugten Wirtsvogelarten, insgesamt sind aus Mitteleuropa aber über 100 Wirtsvogelarten bekannt.

Basic data

Material/Technique:

Measurements:

Gewicht: 55 g, Gesamtlänge: 166 mm,
Schwanzlänge: 51 mm, Flügellänge 104 mm,
Schnabellänge: 13 mm, Lauflänge: 22 mm,
Fangweite: 41 mm

Events

Created	When	
	Who	Dieter Schön
	Where	
Found	When	June 12, 2006

Who Ernst Wolfs (Ornithologe)
Where Ippesheim

Keywords

- Acrocephalus
- Brood parasitism
- Brutschmarotzer
- Cuculidae
- Cuculiformes
- Kuckucke
- Parental care
- Passeriformes
- Sylviidae
- bird